

5


AIDS 関連症候群 (ARC) の診断と治療

5-1


症候による診断手順

(J.G. Bartlett の「Medical Management of HIV Infection」^{1) 2)} を翻訳したものである)


(1) 中枢神経 (CNS) 症状、頭痛




(2) HIV 感染進行期、精神症状（性格変化）、痙攣、頭痛または局所徴候




(3) 咳嗽、発熱、呼吸困難



異常X線所見（続き）




(4) 急性下痢



(5) 慢性下痢 (CD4<300/ μ L)

原因薬剤の除外、血液培養（一般細菌、抗酸菌）

便検査（培養、鏡検、抗酸菌検査、CD チェック、Microsporidia assay）



痙攣性症状、発熱、膿性便、血便

あり

なし

下部消化管内視鏡


上部消化管内視鏡


生検：HE 染色、Giemsa 染色
CMV 染色

生検：HE 染色、Giemsa 染色
CMV 染色
EM：Microsporidia の確認
小腸液吸引・定量培養

診断が見つからないとき

(6) 不明熱 (FUO)





■ 参考文献 ■

- 1) Bartlett JG et al. Medical Management of HIV Infection 2001-2002 Edition. Published by Johns Hopkins Medicine Health Publishing Business Group, 2001
- 2) Bartlett JG et al. Medical Management of HIV Infection 2012, 16th Edition. Published by Johns Hopkins University School of Medicine, 2012

(血液内科 遠藤 知之 2022.08)